



## KOIRIEN KENNELYSKÄ

Kennelyskä on koirien hengitystietulehdus, jonka aiheuttajana on joko parainfluenssavirus tai *Bordetella bronchiseptica* –bakteeri. Kennelyskä on erittäin herkästi pisaratartuntana leviävä, ja itämisaika vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Se leviää erityisen herkästi isoissa koiratapahtumissa (näyttelyt, kokeet, koirapuistot, yms.).

### Oireet:

- yskiminen
- sitkeän ja paksun liman kakominen
- silmien punoitus/vuoto
- sierainvuoto
- joissain tapauksissa kennelyskä voi aiheuttaa myös syömättömyyttä, väsymystä, kuumeilua, sekä hengitysvaikeuksia

Jos oireet ovat lievät, voi koiran vointia seurata kotiooloissa. Kotihoidoista tärkein on lepo, eli koira tulee viedä ulos vain tarpeilleen, ja sisätiloissakin ylimääräistä leikitystä/sykkeitä nostattavaa olisi hyvä välttää. Myös höyryhengityksestä on monesti apua liman irrottamiseen ja yskäoireisiin: valuta suihkusta kuuma vettä niin kauan, että kylpyhuoneeseen kertyy vesihöyryä, ja tuo koira tämän jälkeen hengittelemään vesihöyryä noin 10 minuutin ajaksi.

Jos yleisvointi heikkenee (hengitysvaikeudet, kuume, flegmaattisuus) ole yhteydessä eläinlääkäriin, sillä kennelyskä voi pahimmassa tapauksessa edetä hengenvaaralliseksi keuhkokuumeeksi.

Oireilevan koiran tulee olla kotona karanteenissa oireiden loppumisen jälkeen vielä 2 viikkoa, ja mikäli taloudessa on muita koiria, myös niiden tulee olla karanteenissa pitkän itämisajan vuoksi, jotta kennelyskä ei pääsisi leviämään.

Kennelyskää vastaan voi suojautua rokottamalla; rokote ei anna 100% tautisuojausta, mutta lähes poikkeuksetta lievittää oireita mikäli koira sattuisi sairastumaan tautiin (vrt ihmisten influenssarokote). Rokote annetaan vuosittain parhaimman tehon takaamiseksi.